

RABIVAC® VESZETTSÉG VACCINA HUMAN ALKALMAZÁSA

ÖSSZETÉTEL: 1 fiola, amely 1 oltási adag (1 ml):

≥2,5 NE human diploid sejt kultúrában (HDC) szaporított és inaktivált veszettség vírus (Pitman-Moore törzs) max. 12 mg poligelin, max. 0,3 mg natriumedetat.

JAVALLAT: POSTEXPOSITIÓS OLTÁSOK: Veszettségre gyanús vagy biztosan veszett állattal történt contactus után.

PRAEEXPOSITIÓS OLTÁSOK: Feltételezhető expositio előtt, elsősorban állatorvosok, állatgondozók, vadászok, erdei munkások, állatkereskedők, mézárosok, veszettséggel foglalkozó laboratóriumok munkatársai stb. Esetében, illetve endemiás területen történő hosszabb tartózkodás előtt.

ELLENJAVALLAT: PRAEEXPOSITIÓS OLTÁS: Akut megbetegedés, illetve reconvalescentia időszakában lévők és terhes nők praeexpositiós védőoltásban nem részesülhetnek. Allergia. Expositio után nincs ellenjavallat.

ADAGOLÁS: Iv. Alkalmazás tilos! A RABIVAC-ot im. A m. deltoideusba, kisgyermeknél a comb anterolateralis részébe kell beadni. Immunsuppressív kezelés alatt, valamint veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapotban az első oltás alkalmával két adagot kell beadni két különböző testtájra. Ilyen esetekben a harmadik oltást követően 3-4 nappal ellenanyag-meghatározás javasolt. **F. ÉS GY:** 1 ml (1 adag). **POSTEXPOSITIÓS OLTÁS:** a 0., 3., 7., 14., 30. és 90. napon egy-egy adag. Az oltást azonnal el kell kezdeni! A javallat felállításához lásd a táblázatot. A veszettség elleni oltással kapcsolatos WHO iránymutatás szerint a 6. adag beadása a 90. napon a contactus jellegétől függően elhagyható.

EMLÉKEZTETŐ OLTÁSOK: 2-5 évenként 1x1 adag.

MELLÉKHATÁS: Helyi reakciók: fájdalom, bőrpír és duzzanat. 38 °C feletti láz, nyirokcsomó-duzzanat, arthralgiák és gastrointestinalis panaszok, fejfájás, levertség, keringési zavarok, verejtékezés, hidegrázás, myalgia, valamint allergiás reakciók, átmeneti idegrendszeri zavarok, például paresthesia és inoculációs neuralgia, valamint felszálló bénulás (Guillain-Barre-syndr.). Véletlen intravasalis beadás esetén anaphylaxiás reakció.

FIGYELMEZTETÉS: Azon személyek, akiket nem az előírt számú és időpontokban beadott oltási sorozattal részesítettek alapimmunizálásban, vagy olyan oltóanyaggal lettek oltva, melyek hatékonysága nem éri el a 2,5 NE/adag értéket, hiányosan oltottnak minősülnek. Veszettségre gyanús állatokkal való érintkezés után az alábbi teendők döntő fontosságúak: Azonnali sebkezelés. Harapásos sérülések esetében a sebszél óvatos kimetszése szükséges; ezt követően a sebet nem szabad összevarrni, illetve csak adaptáló varrat helyezhető fel. A tetanusz elleni védettséget biztosítani kell. Valamennyi oltás, valamint a human immunglobulin vagy immunszérum (állati savó) beadását az oltást végző orvos köteles igazolni. Csak az előírt időpontokban beadott veszettség elleni teljes oltási sorozattól várható optimális védőhatás.

TERHESSÉG ÉS SZOPTATÁS: Eddig egyetlen terhesség alatt történt oltás sem okozott az anya vagy a magzat szervezetében az oltással oki összefüggésbe hozható károsodást. Szoptató anya oltása a csecsemőre semmilyen veszéllyel nem jár.

TÁROLÁS: +2 °C–+8 °C, hűtőszekrényben.

Az oltás az ÁNTSZ-en keresztül szerezhető be.

OLTÁSI SÉMA AZ EXPOSITIO MÓDJANAK MEGFELELŐEN

Az expositióra vonatkozó	Az állatra vonatkozó adatok	Oltási séma
I. Az állat érintése, de az állat	Veszett állat	Oltás nem szükséges
II. Bőr az állat nyálával szennyeződött, vagy sérült (karmolás, dörzsölés, felszínes harapásos sérülés)	Az állat veszethez gyanús* és vizsgálatra alkalmas, vagy megfigyelhető	Azonnali oltás B séma szerint bizonytalanság esetén C séma szerinti szimultán prophylaxis. Amennyiben a vizsgált állat egészséges az A séma szerint javasolt az oltás folytatása Tetanusz elleni védeltséget biztosítani kell!
	Az állat veszett, vadállat, vizsgálatra alkalmatlan, vagy nem megfigyelhető	Azonnali C séma szerinti szimultán prophylaxis**1 Tetanusz elleni védeltséget biztosítani kell!
III. Nyálkahártya az állat nyálával szennyeződött, vagy harapásos sérülés	Az állat veszethez gyanús* vagy veszett	Azonnali C séma szerinti szimultán prophylaxis**1 Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján az állat egészséges, az oltás folytatása az A séma szerint javasolt. Tetanusz elleni védeltséget biztosítani kell!

* Veszethez gyanús minden olyan állat, amelyik endemiás területen atypusosan viselkedik. Veszett állatok teteme is fertőző lehet.

** Oltóanyag és immunglobulin vagy immunszérum egyidejű adása.

¹ Magyarországon 1949 óta egyetlen emberi veszethez eset sem fordult elő az általános gyakorlat szerint kizárólagosan aktív védőoltásban részesítettek között, ezért a veszethez elleni humán immunglobulin vagy veszethez elleni immunsérum (állati savó) alkalmazása nem előírt.